

فيروس العوز المناعي البشري ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) في الأردن

فيروس يهاجم خلايا الدم البيضاء ويتكاثر في الدم حتى يقضي على جهاز المناعة.

**فيروس نقص المناعة
البشرية:**

يعتبر المرحلة المتقدمة من الإصابة بعدها فيروس نقص المناعة البشرية، وهو مجموعة من الأمراض والعدوى الانتهائية التي تحدث نتيجة انهيار جهاز المناعة في جسم الإنسان.

**متلازمة العوز المناعي
المكتسب مرض الإيدز:**

مراحل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

الإيدز
AIDS

3

العدوى المزمنة
Chronic HIV Infection

2

العدوى الحادة
Acute HIV Infection

1

- خلايا CD4 تكون أقل من 200 خلية/ mm^3 .
 - يقل مستوى تكاثر الفيروس.
 - قد لا يعاني المصابون من الأعراض.
 - بدون العلاج تتطور الإصابة المزمنة إلى مرض الإيدز خلال 10 سنوات.
 - يزداد تكاثر الفيروس.
 - يهاجم خلايا CD4 المقاومة للعدوى ويدمرها.
 - تزداد خطورة نقل العدوى.
- ضعف جهاز المناعة، وكثرة العدوى والأمراض.
 - بدون علاج يكون المصاب قادرًا على نقل العدوى.
 - بدون علاج يعيش المصاب 3 سنوات.
 - قد لا يعاني المصابون من الأعراض.
 - يقل مستوى تكاثر الفيروس.
 - يزداد تكاثر الفيروس.
 - يهاجم خلايا CD4 المقاومة للعدوى ويدمرها.
 - تزداد خطورة نقل العدوى.
- العنق، التقبيل في الفم المغلق، التصافح بالأيدي.
 - العطس والسعال، والعرق.
 - الأكل مع أو استخدام أواني مشتركة مع مريض الإيدز.
 - أخوات الاستحمام أو السباحة، واستخدام المراحيض أو المناشف.
 - الحشرات، والحيوانات الأليفة.

طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية



طرق لا ينتقل بها



طرق ينتقل بها

- ☒ العنق، التقبيل في الفم المغلق، التصافح بالأيدي.
- ☒ العطس والسعال، والعرق.
- ☒ الأكل مع أو استخدام أواني مشتركة مع مريض الإيدز.
- ☒ أخوات الاستحمام أو السباحة، واستخدام المراحيض أو المناشف.
- ☒ الحشرات، والحيوانات الأليفة.

- ✓ من الأم المصابة إلى الجنين أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.
- ✓ الممارسات الجنسية مع شريك مصاب بالفيروس.
- ✓ مشاركة الأدوات الحادة الملوثة بالفيروس.
- ✓ نقل الدم أو مشتقاته الملوثة بالفيروس.

مدى إنتشار الإيدز في الأردن للفترة 1986-2023



ثلثي المصابين الأردنيين
باليدز بسبب اتصال
الجنسى



نصف المصابين الأردنيين
باليدز حصلت إصابتهم
في الأردن



ثلث العدد التراكمي
للمصابين باليدز في الأردن
أردنيين **628** حالة

النسبة الأكبر للإصابات بين الأردنيين كانت بين الذكور
وفي الأعمار الشابة



%18 من المصابين الأردنيين إناث




%82 من المصابين الأردنيين ذكور

%57 من إصابات الإناث في الفئة
العمرية 39-29

%61 من إصابات الذكور شباب في
الفئة العمرية 39-29

اتجاه أعداد حالات الإصابة باليدز في الأردن خلال الفترة 2023-2020




الاتجاهات والمواقف

تدني نسبة الرجال والنساء في الفئة العمرية (15-45) الذين يعرفون بوجود أدوية للوقاية او منع فيروس نقص المناعة البشرية من الإنتشار في الأردن




إن المعرفة بوجود الأدوية من الاستراتيجيات الناجحة للوقاية

تدني نسبة الشباب الأردنيين لديهم معرفة حول الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية



ارتفاع نسبة الأردنيين لديهم مواقف تمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز

يعتبر استمرار الإتجاهات التمييزية تجاه المصابين بالإيدز تحدياً أمام الجهود المبذولة للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية



تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية



الطريقة الوحيدة للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هي إجراء الاختبار، ويصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها:

- كل شخص يتراوح عمره بين 13 و 64 عاماً إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مرة واحدة على الأقل كجزء من الرعاية الصحية الروتينية.
- الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة إجراء الاختبار بشكل متكرر، وعلى الأقل مرة واحدة سنويًا.

الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية



التحقيف الصحي في مجال فهم طبيعة المرض وطرق انتقاله والوقاية منه.

1

برامج المشورة والفحص الطوعي للأشخاص الذين لديهم ممارسات جنسية خارج الإطار الشرعي على الأقل مرة واحدة في العام.

2

تنفيذ برامج الوقاية من العدوى من الأمهات الحوامل لأطفالهن.

3

تقديم العلاج الثلاثي الوقائي للكوادر التي تتعامل مع المرضى والمصابين في حالة التعرض للعدوى.

4

أخذ الأشخاص غير المصابين أدوية الوقاية السابقة للتعرض لمسبب المرض PrEP.

5

التأكد من عدم إصابة الشريك الجنسي بالإيدز، واستعمال الواقي الذكري ذو الجودة العالية، وبالطريقة الصحيحة في حال عدم التأكيد.

6

التأكد من خلو الدم من الأمراض المععدية وخاصة الإيدز في حال ضرورة تلقي الدم خارج الأردن.

7

إدراج موضوعات حول فيروس HIV في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات الأردنية، مع التركيز على طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.

8



لمزيد من الإطلاع

<https://share-net-jordan.org.jo>

www.hpc.org.jo